



Alkanna oreodoxa Hub.-Mor.

© JMSLC

ALKANNA OREODOXA Hub.-Mor.

Bauhinia 4: 202 (1971)

Familia: Boraginaceae, **subfamilia** Boraginoideae

Nombre común: Alcana turca.

Sinónimos:

Distribución: Endémica de Turquía, zonas montañosas de Antalya, en el SO. de Anatolia.

Etimología: El género procede del latín medieval *alchanna*, nombre de la alcana o alheña, del árabe *alhinna*, planta cuyas raíces y tallos se utilizaban para obtener un tinte a mediados del siglo XV. El epíteto específico *oreodoxus*, -a, -um procede del griego *oreo* = perteneciente a la montaña y *doxa* = gloria, en alusión a que esta bella planta crece en zonas montañosas.

Descripción: Planta herbácea perenne, rupícola, con tallos delgados, poco ramificados, de 10-25 cm de largo, muy frondosos, cubierta de un denso tomento blanquecino de pelos muy cortos y rizados, mezclados con pelos adpresos de 1-2 mm de largo. Hojas alternas, las basales (y las caulinares inferiores) de elípticas a oblanceoladas, enteras, de 1,5-6 x 0,5-1 cm, subagudas, que se estrechan gradualmente hasta formar un pecíolo de 1-2 cm de largo. Las caulinares oblongas, de 1-3 x 0,5-1 cm, brevemente pecioladas o sésiles, transformándose las superiores gradualmente en brácteas. Inflorescencias en cimas a menudo de hasta 20 cm de longitud y con 15-40 flores, con brácteas de oblongas a linear-lanceoladas, de 5-30 x 0,2-10 mm, parecidas a las hojas caulinares superiores, que van reduciendo paulatinamente su tamaño. Pedicelos suberectos, de 1-3 mm de largo. Cáliz gamosépalo, setoso-hispido, de 5-7 mm de largo en flor, acrescente en la fructificación, dividido casi hasta la base en 5 lóbulos linear-lanceolados, agudos en el ápice; corola tubular-infundibuliforme, de 14-17 mm de largo, glabra por fuera y ligeramente papilosa por dentro, con un anillo interno de escamas nectaríferas cerca de la base, con un tubo rosado, amarillento o azulado de 3-5 mm de diámetro, que se ensancha en un limbo de 5 lóbulos orbiculares, blancos, obtusos, de 1-1,5 mm de largo. Androceo con 5 estambres incluidos, insertos por encima de la base de la corola, con los filamentos más cortos que las anteras. Ovario súpero, tetralocular; estilo simple, de 7-8 mm de largo, glabro, con un estigma bilobado. Fruto con 4 núculas monospermas, de 1,7-2,2 mm de diámetro, densamente tuberculadas, estrechadas en un pico corto, recto, horizontal.

Cultivo y usos: Planta muy vistosa por el contraste de sus hojas suavemente tomentosas y sus flores blancas con el centro de color burdeos, poco conocida pero de fácil cultivo, ideal para su utilización en rocallas, que hacia el mes de Mayo nos ofrece su bella floración a lo largo de los tallos. Requiere de un buen drenaje, de suelos calcáreos y de una exposición muy luminosa, pero mejor con algo de sombra. Los riegos, al igual que en otras muchas plantas de rocallas, no deben ser excesivos. Se multiplica con facilidad por semillas y por división de matas.

Referencias:

Huber-Morath. (1971). Novitiae Florae Anatolicae IX. *Bauhinia* 4: 197-222

Davis P.H. ed (1978). Boraginaceae, en *Flora of Turkey and the East Aegean Islands* 6: 237-437