

# APOLLONIAS BARBUJANA (Cav.) Borm.

Verh. Vereins Beförd. Gartenbaues Königl. Preuss. Staaten 21: 10 (1852)

zona 10-11



**Familia:** Lauraceae

**Sinónimos:** *Laurus barbujana* Cav., *Laurus canariensis* Willd., *Apollonias canariensis* (Willd.) Nees, *Persea barbujana* (Cav.) Mabb. & Nieto Fel.

**Nombre común:** Barbusano.

**Lugar de origen:** Islas Canarias y Madeira.

**Etimología:** El nombre del género alude a Apolo, dios de la belleza, de la perfección y de la armonía en la mitología griega, quizás por el verdor y la exhuberancia del follaje del árbol. El epíteto específico *barbujana* es la latinización de su nombre popular "barbusano", pero al parecer, al transcribirse, por un error Cavanilles cambió la "s" por una "j".

**Descripción:** Árbol siempreverde de 12-15(-20) m de altura, con una copa densa y compacta, inicialmente cónica y más tarde más o menos redondeada, con un tronco grueso, o a veces con varios troncos desde la base originados por chupones, muy ramificado, con la corteza lisa y rojiza cuando joven, que con el paso de los años se torna grisácea, agrietándose y cuarteándose longitudinalmente en placas rectangulares que se desprenden con facilidad. Ramillas verde-rojizas, corchosas, glabras, con cicatrices de las hojas. Hojas simples, alternas o algo subopuestas, ovadas, elípticas o anchamente lanceoladas, de 6-10 x 3-4 cm, con la base aguda o atenuada, el margen entero y a veces ondulado y subrevoluto, y el ápice agudo; son de textura algo coriácea, de color verde oscuro brillante, presentando con frecuencia abultamientos (agallas), que en las hojas tiernas son rojizos, producidos por la picadura del ácaro *Aceria barbujanae*. Cuando son nuevas las hojas presentan una coloración rojiza muy característica. Nervadura central marcada, la secundaria reticulada y

poco aparente. Pecíolo corto y delgado, glabro, rojizo, acanalado. Inflorescencias en panículas axilares o subterminales, compuestas de cimas generalmente de tres flores, cuyo pedúnculo común se alarga notablemente en la fructificación. Flores muy abundantes, hermafroditas, de 8-10 mm de largo, blanquecino-amarillentas, olorosas, con el cáliz acrescente y persistente en el fruto y la corola con 6 pétalos lanceolados, glabros, subiguales, ciliolados en el margen. Estambres fértiles 9, con los filamentos hirsutos y las anteras ovado-lanceoladas; estaminodios presentes. Ovario glanduloso, estrechándose en el estilo; estigma discoideo. Fruto en baya lisa y carnosa, monosperma, ovoide, parecido a una aceituna, de 1,5-2 cm de largo, inicialmente de color verde, tornándose negruzco o algo violáceo en la madurez, con una breve cúpula en la base formada por el cáliz acrescente y endurecido. Semilla oblongo-elíptica, de 7-8 mm de largo.

**Cultivo y usos:** Requiere cultivarse en climas templados, libres de heladas, en suelos franco-arcillosos, aunque se adapta a varios tipos de suelos, con pH neutro o algo ácido, en una exposición soleada o con algo de sombra y con aporte de riegos moderados. Su interés ornamental reside principalmente en el brillo y verdor de su follaje y en la tonalidad rojiza de los brotes y de las nuevas hojas. Puede utilizarse de forma aislada o formando grupos o alineaciones. Se multiplica por semillas, aunque éstas conservan su viabilidad poco tiempo. Tiene un crecimiento bastante rápido. Sus semillas son comestibles. Su madera es muy valiosa y resistente, y se ha conocido como "ébano de Canarias", habiéndose empleado en ebanistería, con la fabricación de muebles de lujo, y en carpintería de exterior.