



**Celtis australis L.**

## **CELTIS AUSTRALIS L.**

Sp. Pl. 2: 1043 (1753)

**Familia:** Ulmaceae (algunos autores la incluyen en Cannabaceae y Celtidaceae)

**Nombre común:** Almez, latonero, lidón

**Lugar de origen:** región mediterránea, sur de Europa, sureste de Asia desde Turquía hasta Afganistán, y norte de África desde Túnez hasta Marruecos.

**Etimología:** El nombre *Celtis* procede del nombre antiguo latino *celthis-is*, aplicado por Plinio a un árbol africano diferente, probablemente un azufaifo (*Ziziphus lotus*) y que Linneo adoptó para el género. El término específico *australis* procede del latín *australis-e* = austral, del sur, en alusión a su procedencia del sur de Europa

---

**Descripción:** Árbol caducifolio, polígamo, de 20-25 m de altura, con la copa amplia y redondeada y tronco grueso y recto, con la corteza lisa, grisácea, finamente agrietada con los años; ramas gruesas, erectas; ramillas jóvenes colgantes, pubescentes, de marrones a grisáceas; yemas grisáceo-marrones, pubescentes. Estípulas linear-lanceoladas, pubescentes, que caen pronto. Hojas simples, alternas, dísticas, con la lámina de oval-oblonga a ovado-lanceolada, de 5-15 x 1,5-6 cm, con la base redondeada o subcordada y asimétrica, el margen aserrado o dentado, con 20-32 dientes agudos de 2-3 mm de largo a cada lado, y el ápice largamente acuminado; son de textura algo recia pero flexible, de color verde oscuro mate y con pelos fuertes, que le dan aspereza al tacto, por el haz, más claras, algo glaucas, y pubescentes por el envés. Pecíolo pubescente, de 9-17 mm de longitud; nerviación bien marcada en el haz y destacada por el envés, con 2-4 pares de venas laterales, el par inferior partiendo desde la base y dándole a la hoja apariencia de trinervada. Flores sobre pedúnculos de 20-30 mm de

largo, apareciendo al mismo tiempo que las hojas, las masculinas en grupos de 2-3, en la base de las ramillas del año, las hermafroditas solitarias, en las axilas de las hojas. Poseen un perigonio de 5 piezas sepaloides, oval-lanceoladas, agudas, verdosas, ciliadas en el margen. Androceo con 5 estambres poco salientes y opuestos a las piezas del perigonio. Estilo corto y grueso, con 2 estigmas divergentes, blanquecinos, persistentes en el fruto. Drupa de subglobosa a piriforme, de 10-12 mm de diámetro, al principio verdosa, tornándose casi negra en la madurez y permaneciendo en el árbol hasta bien entrado el invierno.

**Cultivo y usos:** Es buena planta para formar pantallas, permitiendo el recorte, cultivándose como arbusto ramificado hasta el suelo o como arbolito. Requiere suelos bien drenados y temperaturas suaves, una exposición soleada o a media sombra y riegos en verano. Es propenso al ataque de cochinillas. Se multiplica por semillas y por esquejes de madera suave. Aunque su fruto es comestible, no está explotado comercialmente como otras especies del género.