



**Corymbia ficifolia** (F. Muell.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson

**CORYMBIA FICIFOLIA** (F. Muell.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson  
Telopea 6: 245 (1995)

**Familia:** Myrtaceae.

**Sinónimos:** *Eucalyptus ficifolia* F. Muell.

**Nombre común:** Eucalipto rojo.

**Lugar de origen:** nativo del oeste de Australia.

**Etimología:** *Corymbia*, del latín *corymbus*, -i = racimo de flores, corimbo, en botánica un tipo de inflorescencia simple con todas las flores al mismo nivel. El epíteto específico procede del latín *ficus*, -i = ficus y *folium*, -i = hoja, por el supuesto parecido.

**Descripción:** Arbolito siempreverde de 7-8 m de altura, con la copa globosa, densa y algo irregular, y el tronco corto naciendo de un lignotúber, con la corteza persistente, rugosa y fibrosa, de color castaño-grisáceo, fisurada longitudinalmente. Ramillas jóvenes redondeadas, algo escábridas. Hojas juveniles pecioladas, opuestas en los primeros nudos y luego alternas, de ovadas a anchamente lanceoladas, de 6-15 x 3,5-6 cm, con la base peltada o cordada a redondeada o truncada, de color verde mate o poco brillante, muy discoloras. Hojas adultas alternas, con el peciolo achatado o acanalado, de 8-25 mm de largo, y la lámina de anchamente lanceolada a ovada, de 7-14 x 3-5 cm, con la base estrechándose en el peciolo u ocasionalmente redondeada, el margen entero, a veces ligeramente ondulado, y el ápice agudo; son de textura coriácea, muy discoloras, de color verde oscuro por el haz y verde pálidas por el envés; nervadura muy reticulada. Inflorescencia terminal, corimbosa, sobre un pedúnculo anguloso de 1,5-3 cm de largo, formada por la unión de umbelas de 3-7 flores, sobre pedicelos de 1,3-2,7 cm de longitud. Yemas florales de obovoides a piriformes,

de 1,2-1,8 x 0,6-0,8 cm, lisas, con un opérculo de hemisférico a achatado, dos o tres veces más corto que el tubo del receptáculo, que mide 8-10 mm de largo y 6-7 mm de ancho. Estambres curvados hacia adentro, con filamentos rojos, rosados o anaranjados y anteras oblongas, dorsifijas. Estilo largo y recto con estigma apical papiloso. Frutos en cápsulas gruesas y duras, de urceoladas a ovadas, con un estrechamiento hacia el ápice, de 2-4 x 2-3 cm, sobre pedúnculos de 1,5-2,5 cm de largo, con 3(-4) valvas inclusas. Semillas aladas, de color marrón oscuro o negras, elipsoides, de 12-18 mm de largo incluida el ala.

**Cultivo y usos:** Especie algo resistente al frío, pero teme las heladas, por lo que debe cultivarse en zonas templadas. Gusta de suelos de tipo medio, mejor arenosos y bien drenados, neutros o algo ácidos, siendo sensible a los suelos alcalinos y salinos. Prefiere una exposición soleada. Se multiplica por semillas, aunque ello produce plantas variables y con flor de diferentes colores. Tiene un crecimiento algo lento. Su madera es de escaso valor. Su principal uso es como árbol ornamental por su bella floración, que puede ser de color rojo intenso, rosada o anaranjada, más raramente blanca.