



Coussapoa microcarpa L.

COUSSAPOA MICROCARPA (Schott) Rizinni
Dusenía 1(5): 295 (1950)

Familia: Urticaceae (antes incluida en Cecropiaceae)

Nombre común: Higuera negra, higuera de pantano.

Sinónimos: *Brosimum microcarpum* Schott, *Coussapoa fontanesiana* Al.Brongn. ex Trécul, *Coussapoa schottii* Miq.

Lugar de origen: nativo del este de Brasil, en todos sus estados litorales, desde Paraíba y Pernambuco hasta Río Grande del Sur.

Etimología: El género *Coussapoa* procede de la latinización de su nombre nativo *coussapoui*. El término específico procede de las palabras griegas *mikros* = pequeño y *karpos* = fruto.

Descripción: Árbol siempreverde, dioico, de 8-10(-20) m de altura en sus lugares naturales de origen, donde pueden crecer como semiepífitos y estrangulantes sobre otros árboles, con una copa alargada y poco densa, con savia translúcida, no lechosa. Tronco generalmente múltiple, muy ramificado, con la corteza lisa, grisácea y abundantes raíces superficiales. Estípulas amplexicaules, amarillentas, de 1-7 cm de longitud, pubérulas, subseríceas o hirsutas, o con pelos aracnoideos blancos o marrones. Hojas simples, alternas, espiraladas, bastante variables, pero en general de oval-oblongas a obovadas u obovado-lanceoladas, de 3-21 x 2-7 cm, con la base atenuada o redondeada, el margen entero, a menudo algo ondulado hacia la base, y el ápice agudo o cortamente acuminado; son de textura subcoriácea o coriácea, de color verde brillante en el haz, glabras, en ocasiones algo pubérulas o subhirsutas a lo largo de los nervios por el envés; nerviación poco marcada, excepto el nervio medio por el envés, con 6-12 pares de nervios laterales, el primer par más largo, partiendo desde la base y en forma de V. Pecíolo de 1-4 cm de largo, de pubérulo a subhirsuto. Flores unisexuales, en pies diferentes; inflorescencias masculinas ramificadas, con 5-9 capítulos globosos

de 2-3 mm de diámetro, sobre un pedúnculo común de 1-2 cm de largo, de pubérulo a hirsuto; flores con perianto de 1 mm, (3-)4 lobado, pubérulo, estambres 2, unidos, exsertos; inflorescencias femeninas normalmente no ramificadas, en capítulos globosos, solitarios o agrupados, de unos 3-5 mm de diámetro, alcanzando en la fructificación hasta 1 cm de diámetro, sobre un pedúnculo común de 2-5 cm de largo, de pubérulo a hirsuto; flores con perianto tubular o claviforme, con 1 estigma exerto. El fruto es un sincarpo carnoso, globoso, de 0,5-1,5 cm de diámetro, de color amarillo o anaranjado en la madurez, sobre un pedúnculo de 5-7 cm de longitud. Semillas de elípticas a ovals, de color castaño oscuro.

Cultivo y usos: Especie muy resistente que tolera algo el frío, si no es demasiado intenso, poco exigente en suelos, aunque los prefiere algo fértiles y bien drenados, que gusta del sol pero soporta bien la media sombra. Requiere ser formado desde su juventud eliminándole los brotes bajos para dejarle un tronco único y una copa proporcionada. Se multiplica por semillas, que deben enterrarse poco dado su escaso tamaño, y también es posible por esquejes leñosos con hormonas de enraizamiento. Su crecimiento es relativamente rápido, aunque no fructifica hasta pasados varios años. Sus frutos bien maduros pueden consumirse en fresco. La especie a menudo es confundida con un ficus.