



Cynanchum marnierianum

© 2017 JMSLC

CYNANCHUM MARNIERIANUM Rauh

J. Cact. Succ. Soc. Amer. 42: 104 (1970)

Familia: Apocynaceae, subfamilia Asclepiadoideae

Nombre común: planta palo (por su aspecto).

Distribución: nativa del sur de Madagascar.

Etimología: *Cynanchum*, procede el griego *kynos*, *kyon* = perro, y *ancho*, *anchein* = ahogo, estrangulamiento, quizás por lo tóxicas para los canes que resultan algunas plantas del género. El epíteto específico honra al empresario vitivinícola francés, Julien Marnier-Lapostolle (1902-1976), fundador del *Jardín Botánico des Cedres*, en el sur de Francia.

Descripción: Planta baja, arbustiva, laticífera, muy ramificada, con tallos carnosos de 20-50 cm de largo, rastreos o decumbentes, emitiendo raíces en su cara inferior, de 5-7 mm de grosor, de color verde oliva oscuro, verrucosos de forma irregular y cubiertos de pelos blancos de forma dispersa, con entrenudos separados hasta 5 cm. Hojas caducas, decusadas, anchamente elípticas, de 1,5 x 1,5 mm, agudas, de color castaño verdoso. Inflorescencias formando pseudoumbelas de 3-6 flores sésiles, que en estado de yema tienen forma cónica y los pétalos enrollados en espiral. Cáliz con sépalos muy pequeños, estrechamente lanceolados, pelosos por debajo; corola con 5 pétalos estrechamente lanceolados, de 5-6 mm de longitud, de color amarillo verdoso, que en el comienzo de la antesis permanecen unidos en sus extremos formando una vistosa celda o jaula, separándose después de la antesis. La corona es de color blanco, de 1,5-2 mm de altura, formando un cilindro redondeado o anguloso que está denticulado en su margen superior, siendo los dientes entre los pétalos de mayor tamaño que los restantes. Lóbulos estaminales e interestaminales unidos en más de las tres cuartas partes de la longitud de la corona, los interestaminales no diferenciados y los estaminales apoyados contra el dorso de los estambres. Columna estaminal cilíndrica, con anteras de apéndices triangulares, denticulados en los márgenes y recurvados en su ápices. Cabeza estilar blanca, alargada, de 2-3 mm de longitud, bilobado en su extremo, con apariencia de estilo. El fruto es un folículo de hasta 3,5 cm de longitud, con pico largo, conteniendo semillas piriformes de unos 4 mm, lisas, aladas.

Cultivo y usos: Planta ideal para cestos colgantes que requiere una exposición soleada o a media sombra y riegos durante la época de crecimiento, dejándola casi seca en invierno, utilizando preferentemente un sustrato que drene bien y no contenga mucha materia orgánica. Fácil de propagar por esquejes en primavera, que enraizan con bastante rapidez, aunque también es posible multiplicarla por semillas, mejor si son frescas, en un sustrato arenoso.

Referencias:

Werner Rauh (1970). Two new species of *Cynanchum* from Madagascar. *J. Cact. Succ. Soc. Amer.* 42: 104-106

Focke Albers & Ulrich Meve eds. (2002). Illustrated handbook of succulent plants: Asclepiadaceae. Springer

Werner Rauh & Herman Schwartz (1998) Succulent and xerophytic plants of Madagascar. vol. 2. Strawberry Press