

FAMILIA BASELLACEAE

Plantas trepadoras perennes, más bien herbáceas, semisuculentas, provistas de raíces tuberosas, con los tallos generalmente glabros. Hojas alternas o subopuestas, simples, enteras, más o menos carnosas; estípulas ausentes. Inflorescencias en espigas, racimos o panículas terminales o axilares, con flores pequeñas, bisexuales, ocasionalmente unisexuales, actinomorfas, cada una con un par de brácteas en la base; bractéolas en 2 pares opuestos, situadas en la base del cáliz, con el par superior de aspecto sepaloide. Cáliz gamosépalo, con (4-) 5 lóbulos, imbricados, a menudo coloreados, persistente; corola ausente. Androceo con (4-) 5 (-9) estambres, opuestos a los sépalos, con los filamentos connados en la base; anteras biloculares, con dehiscencia variada. Ovario súpero, unilocular, conteniendo un solo primordio seminal; estilo simple, normalmente dividido en 1-3 estigmas. Fruto drupáceo, rodeado parcial o totalmente por el cáliz persistente y a menudo carnoso y por las bractéolas superiores; semillas 1, redondeada. Comprende 4 géneros y unas 22 especies distribuidas principalmente por los trópicos y subtropicos de América, con representantes en Africa ecuatorial, sur de Asia, Nueva Guinea y algunas islas del Pacífico.

En Canarias una sola especie cultivada y ahora asilvestrada en todas las islas.

Anredera Juss. 1789

Plantas trepadoras herbáceas, ramificadas, provistas de raíces tuberosas. Hojas sésiles o subsésiles, ligeramente carnosas. Flores unisexuales o bisexuales, pediceladas, dispuestas en espigas o racimos axilares y normalmente sin ramificar, cada una con 2 pares de bractéolas opuestas, adnatas al perianto, las inferiores pequeñas, connadas o libres, persistentes o caducas, las superiores de aspecto tepaloide, aquilladas. Perianto constituido por 5 piezas petaloideas, membranosas o carnosas, unidas en la base. Androceo con los filamentos filiformes, engrosados en la base, reflejos cuando están en capullo. Gineceo generalmente con 3 estilos; estigmas globosos o claviformes, papilosos. Drupas de ovoides a globosas, cubiertas por el perianto persistente. Semillas lenticiformes. Comprende unas 5-10 especies distribuidas por los trópicos y subtropicos de América, Indias Occidentales y Tasmania. El Género está dedicado a un tal Anreder, persona sobre la que nada se conoce.



Anredera cordifolia

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

Fl. Malesiana ser. 1. Spermatoph. 5(3): 303 (1957)

Boussingaultia cordifolia Ten.

Parra de Madeira

Planta trepadora, glabra, con gruesas raíces tuberosas. Hojas alternas, simples, brevemente pecioladas, de textura subcarnosa, con la lámina de anchamente ovada a suborbicular, de 2,5-6 x 2-5 cm, con la base cordada, el margen entero y el ápice obtuso o subagudo. En las axilas poseen unos pequeños tubérculos o bulbillos. Flores perfumadas, sobre pedicelos de 2-3 mm de largo, generalmente blancas, de 5-6 mm de diámetro, dispuestas en racimos axilares delgados, simples o divididos, de hasta 20 ó 30 cm de longitud, con pedúnculos de 1,5-4 cm de largo. Perianto con 2 bractéolas en la base. Sépalos 2, petaloideos, más cortos que los pétalos; pétalos 5, libres, oblongos o elípticos, de unos 3 mm de largo. Estambres 5, opuestos a los pétalos, blancos. Ovario globoso; estilo blanco, trifido, con estigmas claviformes. Fruto carnoso, globoso, rodeado por el perianto acrescente, que permanece largo tiempo en la planta, aunque en cultivo no suele producir fruto. Es nativa de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Argentina.

Planta resistente y de rápido crecimiento que se utiliza ocasionalmente en muros y verjas de jardines particulares, tanto en zonas bajas como en medianías, siendo más fácil de ver, si cabe, de forma silvestre. Se multiplica por división de los tubérculos radicales o por esquejes.