FICUS AUREA Nutt.

N. Amer. Sylv. 2: 4 (1846) Zona 10-11

Familia: Moraceae.

Sinónimos: *Ficus jimenezii* Standl., *Ficus venusta* Kunth & C.D. Bouché, *Ficus cabusana* Standl. & Steyerm., *Ficus warszewiczii* (Miq.) Miq.

Nombre común: Higuera estranguladora, higuera dorada, higuerón.

Lugar de origen: Desde Florida y las Antillas Mayores (Cuba, Jamaica, Islas Caimán, La Española y Puerto Rico) hasta el sur de México, y toda América Central hasta Panamá.

Etimología: El nombre del género procede del latín *Ficus-i*, nombre clásico de la higuera (*Ficus carica*) y de su fruto el higo. El epíteto específico procede del latín *aureus,-a,-um* = dorado.

Descripción: Árbol siempreverde o semicaducifolio, de hasta 20 m de altura, mucho más en sus lugares de origen, laticífero, con una copa amplia y redondeada, con raíces aéreas que llegan hasta el suelo y enraízan formando pilares. En sus lugares de origen es una especie epífita y estranguladora. Tronco grueso, irregular, de corteza lisa y grisácea, que se oscurece y se torna escamosa con los años. Ramillas gruesas, lenticeladas y con cicatrices de las hojas, amarillentas o verdosas cuando jóvenes. Estípulas ovado-lanceoladas, gruesas y firmes, verdosas, pubérulas o glabras, de 1-2(-4) cm de largo, caedizas. Hojas alternas, con la lámina de ovada a oblonga o anchamente obovada, de 6-15(-20) x 3,5-6(-12) cm, con la base de redondeada a cuneada, el margen entero y el ápice obtuso o cortamente apiculado; son de textura subcoriácea, glabras en ambas caras, de color verde brillante o verde amarillento por el haz, y más pálidas y sin brillo por el envés; nervadura con el nervio central amarillento y algo sobresaliente y con 7-10(-12) pares de nervios laterales menos marcados y a menudo espaciados sin regularidad, con el par basal sin ramificar. Pecíolo glabro, de 2,5-6 cm de largo, ligeramente acanalado por el haz. Siconos normalmente sésiles o subsésiles, solitarios o con mayor frecuencia dispuestos en pares, envueltos al principio por una bráctea membranácea que pronto cae; pedúnculos glabros y de hasta 15 mm de largo cuando existen; receptáculos subglobosos, de 6-15 mm de diámetro, glabros o subglabros, al principio amarillentos o verdosos y con puntos blancos dispersos por su superficie, tornándose rojizos en la madurez; ostiolo apical de 1-2 mm de diámetro, más o menos prominente (umbonado). Brácteas basales 2, ovado-redondeadas, de 4-8(-12) mm de largo, glabras, persistentes.

Cultivo y usos: Especie muy variable en la forma y tamaño de sus hojas, siconos y brácteas basales, de la que se reconocen varias formas. Requiere climas tropicales o subtropicales, donde no haya heladas, suelos bien drenados, mejor sueltos o arenosos, ácidos o alcalinos, y una exposición soleada o con ligera sombra. Soporta la proximidad a la costa, pero no en primera línea, así como la sequía, aunque hay que proporcionar riegos en la época de crecimiento. Su crecimiento es rápido y su sistema radicular es agresivo, lo que se debe tener en cuenta. Se multiplica por semillas, por esquejes y por acodos.

© 2026 José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres
www.arbolesornamentales.es