FICUS PETIOLARIS Kunth

Nov. Gen. Sp. 2: 49 (1817) Zona 10-11

Familia: Moraceae.

Sinónimos: *Urostigma petiolaris* (Kunth) Miq., *Ficus petiolaris* subsp. *palmeri* (S. Watson) Felger & Lowe, *Ficus petiolaris* subsp. *brandegeei* (Standl.) Felger & Lowe, *Ficus jaliscana* S. Watson, *Ficus palmeri* S. Watson

Nombre común: Amate amarillo, higuera de roca.

Lugar de origen: Desde Baja California y Sonora hasta Oaxaca (México).

Etimología: El nombre del género procede del latín *Ficus-i*, nombre clásico de la higuera (*Ficus carica*) y de su fruto el higo. El epíteto específico procede del latín *petiolaris,-e* = con pecíolos muy largos.

Descripción: Árbol siempreverde o semicaducifolio, dependiendo de las condiciones, muy variable (algunos autores reconocen hasta 3 especies), de 5-8 m de altura en cultivo, pudiendo alcanzar más de 15 m de talla en su lugar de origen, con la copa amplia y redondeada, con pocas raíces aéreas o sin ellas, a menudo ramificado desde la base y con varios troncos, más bien delgados, de corteza lisa, amarillenta o amarillo-verdosa, que se desprende en escamas. Tallos jóvenes cremoso-grisáceos, lisos, glabros, con abundantes cicatrices de las hojas viejas. Estípulas normalmente glabras, a veces pubescentes, de 2-5(-7) cm de largo, amarillentas o rojizas, caedizas. Hojas alternas y dispuestas en espiral, anchamente ovadas o redondeadas, con la lámina de 5-14 x 3-15 cm, con la base cordada que forma dos lóbulos que a veces se superponen, el margen entero y a menudo repando, y el ápice redondeado o cortamente apiculado; son de textura algo coriácea, glabras y de color verde oscuro por el haz, y más claras o verde-grisáceas, y a veces pubescentes, por el envés; nervadura prominente, con 6-9(-11) pares de nervios laterales que al principio a veces son de color rosado en el haz, tornándose más tarde amarillentos; a veces son característicos unos penachos de pelos blancos en las axilas de los nervios basales del envés; pecíolo de 5-14 cm de longitud, normalmente glabro, a veces pubescente, acanalado, verdoso o rojizo. Siconos carnosos, solitarios o en pares, axilares, sobre pedúnculos glabros o algo pubescentes de 0,5-2,5 cm de longitud; receptáculo de 8-15 mm de diámetro, globoso o ligeramente piriforme, glabro o pubescente, de color verde amarillento con puntos resaltados más oscuros o a veces sin ellos; ostíolo de 2-3 mm de diámetro. Brácteas basales 2, de 2-5 mm de largo, amarillentas, glabras, persistentes.

Cultivo y usos: Árbol que requiere ser cultivado al exterior en zonas de clima suave, libre de heladas, en suelos diversos pero que drenen muy bien (en su zonas origen vive sobre suelos pedregosos y rocosos), bajo una exposición soleada o muy luminosa y con aporte de riegos muy moderados, pues soporta bien la sequía. Cultivado en maceta desarrolla un cáudice basal, siendo utilizado por coleccionistas y en técnicas bonsái. La corteza se utiliza localmente para fabricar el llamado papel amate, y su látex tiene propiedades medicinales.

© 2026 José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres
www.arbolesornamentales.es