



Jasminum subhumile

© 2016 JMSLC

JASMINUM SUBHUMILE W.W. Sm.

Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 8: 127 (1913)

Familia: Oleaceae

Sinónimos: *Jasminum heterophyllum* Roxb., *Jasminum diversifolium* Kobuski

Nombre común: Jazmín amarillo italiano

Descripción: Arbusto siempreverde, denso, de 1-3 m de altura, con los tallos flexibles, ligeramente angulosos, glabros o pubescentes. Hojas alternas, con el pecíolo de 2,5-6 cm de largo y (1-) 3 folíolos, de lanceolados a anchamente ovados, el terminal de 2-12 x 1-6 cm, los laterales algo menores, con la base redondeada o cuneada, el margen entero y el ápice de agudo a largamente acuminado; son sésiles o con peciólulos de 4-15 mm de largo, de textura algo coriácea, glabros por el haz y normalmente algo pubescentes por el envés, con 3-6 pares de nervios laterales poco marcados. Inflorescencias en panículas terminales de 20-50 flores, fragantes, de color amarillo, sobre pedicelos glabros o pubescentes de 1-20 mm de longitud. Brácteas lineares, de 1-5 mm de largo. Cáliz urceolado, glabro o pubescente, con el tubo de 1-2 mm de largo y 5 lóbulos triangulares diminutos; corola hipocrateriforme, con el tubo de 9-12 mm de longitud y el limbo de 4-5 lóbulos redondeados u oblongos, de 4-9 mm de largo. Fruto en baya ovoide-globosa, de 6-12 mm de diámetro, de color negro en la madurez.

Distribución: Nativo de Nepal, Tíbet, India, Burma y China.

Cultivo y usos: Arbusto que requiere zonas cultivarse en zonas templadas, en suelos de tipo medio, bien drenados, necesitando riegos bajos o moderados, algo más abundantes en el verano y mientras la planta se está estableciendo, y una exposición soleada o a media sombra. Es una especie bastante resistente y de escaso mantenimiento. Se multiplica por esquejes con relativa facilidad.

Referencias:

Green P.S. & Miller D. (2009) The genus *Jasminum* in cultivation. Kew Publishing

Watson M.F. (1999) *Jasminum*, en Flora of Buthan 2(2): 585-594

Chang M.C. & Green P.S. (1996) *Jasminum*, en Flora of China 15: 397-419