



Pistacia chinensis Bunge

PISTACIA CHINENSIS Bunge

Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg 2: 89 (1835)

Familia: Anacardiaceae.

Sinónimos: *Pistacia formosana* Matsum., *Pistacia philippinensis* Merr. & Rolfe, *Rhus gummifera* H. Lévl.

Nombre común: Pistachero chino.

Lugar de origen: nativo de China, Taiwán y Filipinas.

Etimología: El género deriva del latín *pistacium*, -i, que a su vez deriva del griego *pistakion*, el fruto del pistachero. El epíteto específico *chinensis*, -e = de China, su principal lugar de procedencia.

Descripción: árbol caducifolio, dioico, de 4-20 m de altura, con una copa redondeada y simétrica si crece en lugar soleado, y el tronco con la corteza escamosa, de color castaño. Hojas normalmente paripinnadas, de 15-25 cm de largo, con el pecíolo de 3-10 cm de largo, pubescente, aplanado en la cara superior, y el raquis estriado y no alado, pubérulo, con 5-7(-10) pares de folíolos, faltando a veces uno del par terminal, siendo entonces la hoja imparipinnada. Folíolos opuestos, de lanceolados a ovado-lanceolados, de 4-10 x 0,8-2,5 cm, con la base oblicua, el margen entero y el ápice acuminado o largamente acuminado; son de textura papirácea, de color verde oscuro brillante en el haz y más claros en el envés, pubérulos en los nervios de ambas caras; nerviación destacada, con 10-14 pares de nervios laterales; pecíolulos de 1-2 mm de largo. En el otoño los folíolos toman una bella coloración rojiza, anaranjada o amarillenta antes de su caída. Inflorescencias apareciendo antes que las hojas, las masculinas racemosas, densas, de 6-7 cm de largo, puberulentas, las femeninas paniculadas, más

laxas, de 15-20 cm de largo, pubérulas. Flores olorosas, rojizas, sobre cortos pedicelos pubescentes y acompañadas de brácteas de ovado-oblongas a lanceoladas, de 1,5-2 mm, pubescentes. Flores masculinas con 2 bractéolas lanceoladas y 2 tépalos linear-lanceolados de casi 1,5 mm, con androceo de 3-5 estambres de filamentos muy cortos y anteras elipsoides u oblongas; flores femeninas con 2-4 bractéolas linear-lanceoladas y 5 tépalos ovados u oblongos de 0,7-1,5 mm; ovario globoso, glabro; estigma grueso, rojo. Frutos en drupas globosas u obovado-globosas, ligeramente comprimidas, de unos 5-6 mm de diámetro, al principio de color verde, tornándose rojizas y más tarde azuladas al madurar.

Cultivo y usos: Es un árbol muy resistente al frío que se cultiva principalmente por su coloración otoñal y los racimos de frutos rojizos o azulados; soporta muchas clases de suelos siempre que no sean calizos y que estén bien drenados, resistiendo la sequía una vez establecido. Gusta de exposición soleada o a media sombra. Requiere poda de formación al principio. Se utiliza como portainjerto del pistachero (*Pistacia vera*). Las hojas jóvenes y brotes son consumidos en China. Su fruto es comestible y produce aceites con varios usos. La madera es fuerte y densa y se utiliza en la fabricación de muebles. En la medicina china todas las partes de la planta son utilizadas contra varias dolencias.