PSIDIUM CATTLEYANUM Sabine

Trans. Hort. Soc. London 4: 317 (1821) Zona 10-11

Familia: Myrtaceae.

Sinónimos: *Psidium arboreum* Vell., *Psidium buxifolium* Nutt., *Psidium littorale* Raddi, *Psidium littorale* var. *longipes* (O. Berg) Fosberg, *Psidium obovatum* Mart. ex DC.

Nombre común: Guayabo fresa.

Lugar de origen: Brasil y Uruguay. Introducido en numerosos países, constituyendo una especie muy invasora en algunos de ellos.

Etimología: *Psidium*, procede del griego *psidion*, nombre del granado, probablemente por la relativa semejanza de los frutos de ambas especies. El epíteto específico está dedicado a William Cattley (1788-1835), comerciante y horticultor británico, coleccionista de plantas de todo el mundo.

Descripción: Arbolito o arbusto siempreverde de 3-8 m de altura, con una copa redondeada e irregular y un tronco algo tortuoso con la corteza lisa, de color marrón grisáceo, que se desprende en tiras papiráceas dejando ver la capa interna de color marrón verdoso claro. Ramillas cilíndricas, marrones, glabras. Hojas simples, opuestas, oblanceoladas, obovadas o elípticas, con la parte más ancha en la mitad superior, de 4-9 x 2,5-4,5 cm, con la base cuneada, el margen entero, y a veces ligeramente revoluto, y el ápice agudo u obtuso; son de textura coriácea, glabras por ambas caras, de color verde oscuro brillante por el haz y más claras y mate por el envés, con la nervadura muy poco marcada, con 6-13 pares de nervios secundarios laterales que no llegan al borde de la lámina y se unen formando un falso nervio submarginal. Pecíolo verde, de 6-13 mm de largo. Flores solitarias, axilares, de 2-2,5 cm de diámetro, sobre pedicelos de 2-10 mm de largo, con hipanto obcónico de 2-5 mm de largo. Cáliz verde, glabro, con 4-5 lóbulos redondeados, cóncavos, persistente en el fruto; corola de 4-5 pétalos de obovados a elípticos, blancos, de 7-8 mm de longitud. Androceo con numerosos estambres filiformes, de 3-8 mm de largo. Gineceo con un ovario ínfero de 3-5 lóculos, con 10-28 óvulos por lóculo; estilo de 4-8 mm de largo. Frutos en bayas globosas u obovoides, de 2,5-4 cm de largo, inicialmente verdes, pasando al madurar a amarillos o rojizos, según variedades, con los lóbulos del cáliz engrosados en el ápice. Pulpa blanquecina o rosada, jugosa y olorosa, dulce pero con un ligero fondo ácido. Semillas numerosas, redondeadas o elípticas, de 3-6 mm de largo, lisas, de color crema o marrón claro.

Cultivo y usos: Prefiere climas subtropicales o mediterráneos, soportando el frío si es ligero y suelos diversos, mejor franco-arenosos, bien drenados y fértiles, con pH entre 6 y 7. Requiere una exposición soleada, pero soporta sombra parcial, y el aporte de riegos espaciados, más abundantes en la floración y fructificación. Se multiplica por semillas, siendo su crecimiento de moderado a rápido. Soporta la cercanía a la costa y el ambiente de las ciudades. Sus frutos son ricos en vitamina C y antioxidantes, y se consumen frescos o en la elaboración de jaleas, mermeladas, licores, etc.

© 2026 José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres
www.arbolesornamentales.es