# SPATHODEA CAMPANULATA P. Beauv.

Fl. Oware 1: 47, t. 27, 28 (1805) zona 10-11

**Familia**: Bignoniaceae
**Sinónimos**: *Spathodea nilotica* Seem., *Spathodea tulipifera* (Schum.) G. Don
**Nombre común**: tulipero del Gabón.
**Lugar de origen**: África tropical.
**Etimología**: El nombre deriva del griego *spathe* = espata, y *el sufijo -odes*, que indica parecido, aludiendo al cáliz, y el epíteto específico procede de *campanula-ae* = campanita, diminutivo del latín tardío *campana-ae* = campana, más el sufijo –*atus-a-um*, que indica posesión o parecido, con flores campanuladas.

**Descripción**: árbol de 10-13 m de altura en cultivo, pudiendo llegar a los 30 m en estado silvestre, con una copa pequeña y redondeada y un tronco alto, de corteza oscura, longitudinalmente fisurada y escamosa con los años, desarrollando, además, contrafuertes en la base; ramillas lenticeladas, glabras o tomentosas. Hojas imparipinnadas, con 4-8 pares de folíolos elípticos, subsésiles, de 3-16 x 2-9 cm, con la base cuneada o algo asimétrica, el margen entero o repando y el ápice agudo o acuminado; son ligeramente pubérulos en los nervios del haz y más densamente por el envés. El folíolo terminal es generalmente de mayor tamaño y algo desigual a los restantes. Pecíolo de 8-25 (-30) cm de longitud. Inflorescencias en racimos terminales, con brácteas lanceoladas, de 1-2 cm de largo, y 2 bractéolas en la base de cada flor; cáliz espatáceo, de 3,5-6 cm de largo, que se estrecha en una punta curvada, glabro, algo pubérulo o tomentoso, a veces con costillas longitudinales; corola rojo-anaranjada con el borde amarillento, en ocasiones totalmente amarilla, de 7,5-13 x 6-12 cm, glabra en el exterior y espaciadamente pubescente en su interior, anchamente acampanada en la parte superior y cilíndrica y estrecha en la base; tubo de 1,2-1,5 cm de largo, oculto por el cáliz; limbo con los lóbulos de anchamente triangulares a redondeados, de 1-3,5 cm de largo, con el borde arrugado. Estambres didínamos, subexertos, con las tecas divergentes, de 6-9 mm de largo. Estilo de 5-7 cm de longitud; estigma bilobado, con lóbulos de 5-7 mm, más o menos elípticos. Fruto en cápsula oblongo-elíptica, de 15-20 x 2,5-4 cm, erecto, ligeramente leñoso, glabro o tomentoso cuando joven, dehiscente en 2 valvas que asemejan un bote de fondo plano. Semillas delgadas, con alas membranáceas y transparentes, de 23-30 x 27-52 mm incluidas las alas.

**Cultivo y usos**: Se multiplica por semillas. Árbol no demasiado exigente y de crecimiento relativamente rápido. Las heladas le perjudican, sobre todo a los ejemplares jóvenes, que llegan a morir. Florece abundantemente en exposición soleada. Especie muy utilizada como árbol de alineación, de forma aislada o formando grupos. Sus brotes nuevos son, con frecuencia, invadidos por los pulgones, cuya melaza impregna las aceras si no se pone remedio.

© 2011 José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres
www.arbolesornamentales.es