TABEBUIA HEPTAPHYLLA (Vell.) Toledo

Arq. Bot. Estado Sao Paulo 3: 33 (1952) Zona 10-11

Familia: Bignoniaceae

Sinónimos: *Bignonia heptaphylla* Vell., *Hadroanthus heptaphyllus* (Vell.) Mattos, *Tabebuia ipe* (Mart. ex K. Schum.) Standl.

Nombre común: Lapacho rosado.

Lugar de origen: Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia.

Etimología: El nombre *Tabebuia* procede de su nombre vernáculo brasileño *tabebuia* o *taiaveruia*. El epíteto específico procede del griego del griego *hepta* = siete y *phyllon* = hoja, por el número de folíolos.

Descripción: árbol caducifolio de 10-15(-20) m de altura, con un tronco recto con la corteza castaño grisácea o gris oscura con abundantes surcos longitudinales con el paso de los años. Hojas palmeadas, con 5(-7) folíolos ovados, oblongos o elípticos, de 6,5-9,5 x 2,5-4,5 cm el principal, los laterales y basales progresivamente más pequeños, con la base cuneada, el margen regularmente aserrado y el ápice de acuminado a largamente acuminado. Son de textura membranácea o semicoriácea, más o menos concoloros, algo lepidotos en el haz y el envés, con alguna pubescencia en los nervios. Pecíolo de 3,5-8 cm de largo; peciólulos de 2-5 cm de largo, siendo el del folíolo principal el más largo. Las hojas jóvenes tienen folíolos ovados con el margen aserrado con dientes grandes irregulares. Inflorescencias en panículas terminales con el raquis pubescente, portando hasta 40 flores de 5-8 cm de largo, sobre pedicelos pubescentes de 3-6 mm de largo. Cáliz de acampanado a tubular-acampanado, de 4-11 x 3-8 mm, pubescente, truncado o con 5 dientes irregulares violáceo-rosados; corola de rosada a violácea, con la garganta amarilla o con bandas blancas y amarillas, tubular-acampanada, con un tubo de 3-5 cm de largo y 5 lóbulos de 1,5-2 cm de largo, puberulentos externamente. Estambres didínamos, desiguales, de hasta 1,6 cm de largo los mayores, con anteras de 4-7 mm. Ovario súpero, bilocular, fusiforme, de 2,5-4 mm de largo, conteniendo numerosos óvulos; estilo de 1,7 cm; estigma elíptico, de 2-2,3 mm. Fruto en cápsula cilíndrica, glabra, atenuada en ambos extremos, fuertemente estriada, de 29-55 x 1,3-1,5 cm, con las valvas coriáceas. Semillas de 0,7-1 cm de largo, con alas laterales blanco-ocráceas, hialinas, bien demarcadas del cuerpo de la semilla.

Cultivo y usos:. Requiere climas cálidos o templados, libres de heladas, aunque cuando es adulto soporta algo el frío si no es demasiado intenso o duradero. Prefiere suelos fértiles, profundos y fértiles, que drenen bien, neutros o ligeramente ácidos, soportando bien la sequía, aunque en verano gusta de riegos. Para florecer en abundancia necesita una exposición soleada. Se multiplica por semillas. Árbol interesante para alineaciones por su espectacular floración hacia los meses de Marzo-Abril. Su madera es dura y resistente, empleándose en construcción civil y naval, carpintería, etc. La corteza tiene localmente aplicaciones medicinales contra infecciones y como antiinflamatorio.

© 2026 José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres
www.arbolesornamentales.es