TABEBUIA PALLIDA (Lindl.) Miers

Proc. Roy. Hort. Soc. London 3: 199 (1863) Zona 10-11

Familia: Bignoniaceae

Sinónimos: *Bignonia pallida* Lindl., *Tabebuia dominicensis* Urb., *Tabebuia heterophylla* subsp. *pallida* (Lindl.) Stehlé

Nombre común: Lapacho blanco.

Lugar de origen: Endémico de las Islas de Sotavento y de Barlovento (Antillas Menores), en el mar Caribe. Cultivado e introducido en otras islas.

Etimología: El nombre *Tabebuia* procede de su nombre vernáculo brasileño *tabebuia* o *taiaveruia*. El epíteto específico procede del latín *pallidus,-a,-um* = pálido, en alusión al color blanco o rosa pálido de las flores.

Descripción: Árbol semicaducifolio de talla pequeña a mediana en nuestras latitudes, alcanzando los 8-10 m., aunque en sus lugares de origen puede alcanzar tallas mucho mayores, con la corteza de color gris oscuro que se fisura y agrieta con el paso de los años. Ramillas de cilíndricas a angulosas, lepidotas. Hojas unifoliadas o trifoliadas, con los folíolos oblongo-elípticos, de 6-16 x 4-9 cm, los laterales de menor tamaño que el terminal, con la base de redondeada a truncada, el margen entero y el ápice de redondeado a obtuso; son de textura coriácea, de color verde brillante, más o menos concoloros, lepidotos en ambas caras, con el pecíolo articulado, de 1-7 cm de largo. Nervio central amarillento, más destacado por el envés, con poco nervios secundarios laterales, que se bifurcan mucho antes de llegar al margen de la lámina. Inflorescencias terminales con pocas flores, sobre pedicelos lepidotos. Cáliz cupular, de 10-17 mm de largo, bilabiado o con 4-5 lóbulos irregulares, ligeramente lepidoto; corola tubular-infundibuliforme, glabra externamente, de color blanco o rosa pálido con la garganta amarillenta, de 5-8 cm de longitud y 1,5-2,5 cm de anchura en la garganta, con el tubo de 3-6 cm de largo y los lóbulos de 1,5-2 cm de longitud, con frecuencia erosos en el margen. Estambres didínamos, con tecas de 2-3 mm de largo. Ovario linear-cilíndrico, lepidoto, de 5 mm de largo. Fruto en cápsula linear-cilíndrica, de 11-23 cm de largo y 0,8-1,1 cm de anchura, densamente lepidoto, atenuado en los extremos, con el cáliz persistente. Semillas delgadas, de 5-8 mm de largo, con alas laterales membranosas e hialinas fuertemente diferenciadas del cuerpo de la semilla.

Cultivo y usos: Requiere climas cálidos tropicales o subtropicales, no tolerando las heladas, aunque puede soportar algún frío breve y puntual. No es muy exigente en suelos, siempre que estén bien drenados y sean de ligeramente ácidos a neutros. Necesita exposición solar y resiste bien las sequías. Se multiplica por semillas. Sistema radicular poco agresivo, siendo por ello, unido a su tamaño, interesante para alineaciones urbanas. Su madera es fuerte y resistente a las termitas, empleándose en carpintería y construcción naval. Localmente las infusiones de su corteza y sus hojas se han empleado en medicina tradicional.

© 2026 José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres
www.arbolesornamentales.es