Aeschynanthus



Aeschynanthus lobbianus

Existen numerosas especies en cultivo, destacando entre las más populares como plantas de interior **A. radicans** Jack, **A. marmoratus** T. Moore, **A. speciosus** Hook. y **A. lobbianus** Hook., así como sus híbridos 'Red Cascade', 'Black Pagoda'.

Se multiplican por esquejes con hojas, utilizándose las semillas para la obtención de nuevas formas.

Familia: Gesneriaceae

Procedencia: Asia tropical

Plantas subarbustivas o hierbas perennes, a menudo epífitas o trepadoras en su ambiente natural, con los tallos colgantes. Hojas dispuestas en pares opuestos desiguales, algo carnosas. Las flores aparecen solitarias o se disponen en fascículos axilares o terminales. Tiene el cáliz tubular, con 5 lóbulos o dientes, a menudo coloreado; corola tubular, bilabiada, con el labio superior bilobado y el inferior trilobado. Androceo con 4 estambres. El fruto es una cápsula linear que se abre en 2 valvas, conteniendo numerosas semillas elipsoides, a veces con pelos en los extremos.

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO

Suelo/Sustrato: bien poroso y drenado, con temperatura alrededor de 20 °C.

pH: ácido, de 5 a 5,5

Humedad relativa: entre 60-70 %., disminuyéndose en invierno.

Temperaturas: nocturnas por encima de 16 °C. Mínimas de 12 °C y máximas de 30 °C

Luminosidad: 40.000 lux o superior.

Los aeschynanthus (Barra de labios) se cultivan como plantas de maceta colgantes, luciendo así la vistosidad de su floración. Su floración es bastante prolongada si disponen de una iluminación alta y temperaturas suaves. Son sensibles a los sustratos encharcados, produciéndose asfixia de raíces.

Además de problemas de tipo fisiológico (carencias o excesos), pueden sufrir ataques de pulgones y ácaros. También sufren podredumbres producidas por *Sclerotium* y *Rhizoctonia* y manchas en las hojas producidas por *Corvnespora*.