



Montanoa bipinnatifida

© 2010 JMSLC

MONTANOA BIPINNATIFIDA (Kunth) C.

Koch

Wochenschr. Vereines Beförd. Gartenbaues Königl. Preuss. Staaten 7: 408 (1864)

Uhdea bipinnatifida Kunth

Familia: Asteraceae (Compositae)

Nombre común: margarita arbórea, margaritero.

Descripción: Planta arbustiva muy ramificada, con los tallos leñosos en la base, que puede alcanzar 2-4 m de altura o más en cultivo. Hojas opuestas, pinnatífidas, de 50-75 cm de longitud, con 4-5 segmentos irregulares a cada lado, de ovados a lanceolados, con el margen aserrado o dividido; son de color verde oscuro y algo ásperas en el haz, y diminutamente pubescentes por el envés. Pecíolo de 10-20 cm de largo, a menudo alado y con dos pequeñas aurículas cerca de la base. Inflorescencia en panícula muy ramificada, de hasta 1 m de largo, compuesta de numerosos capítulos ligulados de 5-6 cm de diámetro, sobre pedúnculos pelosos de 2-7 cm de longitud; involucre con 8-13 brácteas dispuestas en 2 series, de ovadas a lanceoladas, patentes o algo reflejas, de 6-8 mm de longitud. Flores radiales liguladas 10-13, estériles, blancas, con lígula de 2,5-3,5 cm de largo, obovada, con el ápice redondeado o tridentado; flores del disco 150 o más, hermafroditas, tubulosas, de color verde al principio, tornándose más tarde amarillas, de 5-7 mm de largo. Aquenios de 3,5 x 2 mm, obovados, algo comprimidos, negruzcos.

Distribución: Nativa de México. Naturalizada en

Sudáfrica y Australia.

Cultivo y usos: Requiere una exposición soleada o a media sombra, suelos bien drenados, riegos en verano y climas suaves libres de heladas, pues es bastante sensible al frío. Se multiplica por semillas y por esquejes.

Referencias:

Malezas de México. <http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/2inicio/home-malezas-mexico.htm> accedido el 20 marzo de 2010