



Pimpinella saxifraga

© 2010 JMMLC

libre y bífido.

## PIMPINELLA SAXIFRAGA L.

Sp. Pl. 1: 263 (1753)

**Familia:** Apiaceae (Umbelliferae)

**Nombre común:** Pimpinela blanca, saxífraga menor

**Descripción:** Planta herbácea perenne, generalmente pelosa, rara vez glabra, erecta, ramificada, de hasta unos 80 cm de altura, con los tallos más o menos macizos, cilíndricos y finamente estriados, que nacen de una raíz leñosa, axonomorfa, de hasta 30 x 0,5 cm. Hojas de morfología muy variable, las basales arrosetadas, pinnatisectas, de 4-30 cm de longitud, con 3-7 (-11) pares de segmentos que pueden ser desde enteros y ovoides a pinnatisectos, con lóbulos lineares, transformándose gradualmente y a medida que ascendemos en el tallo. Pecíolo estriado, pubescente, de 6-12 cm de largo; hojas superiores muy reducidas, de 2-5 cm de longitud, de enteras a pinnatisectas y a menudo reducidas al pecíolo o a la vaina foliar. Umbelas de 2 a 4 (-8) por tallo, terminales, de 3-4 cm de diámetro, con 6-15 radios desiguales, con longitudes que oscilan entre 9 y 35 mm, péndulas al inicio de la floración, desprovistas de brácteas o con éstas prontamente caducas; umbélulas con 8-12 (-16) flores desprovistas de bractéolas, con radios desiguales de unos 3 mm de largo. Corola con los pétalos blancos, a veces manchados de rojo, obovados y a menudo emarginados, levemente desiguales, pelosos en el centro; estambres con los filamentos glabros, blancos. Frutos marrones, de 2-2,5 mm de largo, con los mericarpos elipsoides, glabros y de superficie lisa, sin costillas prominentes. Carpóforo setáceo,

**Distribución:** Gran parte de Europa, Siberia, Cáucaso, oeste de Asia.

**Usos:** Se ha utilizado medicinalmente como expectorante, diurética, carminativa y estomacal, aunque hoy en día se encuentra en desuso. Requiere lugares secos y exposición soleada o a media sombra. Se multiplica por semillas.

### Referencias:

Tutin T.G. (1980) Umbellifers of the British Isles. Botanical Society of the British Isles. London.

Sell P. & Murrell G. (2009) Apiaceae. Flora of Great Britain and Ireland. vol. 3. Cambridge University Press.

Nieto Feliner G., Herrero A. & Jury S.L. eds. (2003) Umbelliferae, en Castroviejo, S. edit. Flora Iberica 10: 13-410. C.S.I.C. Madrid.