



**Familia:** Combretaceae

**Sinónimos:** *Bucida buceras* L., *Myrobalanus buceras* (L.) Kuntze, *Bucida subinermis* Bisse, *Bucida palustris* Borhidi & O. Muñiz

**Nombre común:** Júcaro de playa

**Lugar de origen:** Especie nativa de México y toda Centroamérica llegando hasta Colombia; también presente en las Antillas Mayores.

**Etimología:** El género deriva del latín *Terminalia*, -ium, fiestas dedicadas al dios Términus, deidad que presidía en Roma los límites o fronteras, aludiendo probablemente a la disposición de las hojas, que aparecen agrupadas en los extremos de los tallos. El epíteto específico procede del latín *bucerus*, -a, -um = que tiene cuernos de buey, en referencia a las agallas curvadas de los frutos producidas por ácaros.

**Descripción:** Árbol siempreverde de 5-15 m de altura, con una copa de crecimiento simpódico, al principio algo piramidal y más tarde extendida y densa, proyectando buena sombra, y un tronco recto y grueso, con la corteza lisa y grisácea de joven, oscureciéndose y agrietándose con el paso de los años. Ramas a menudo con espinas de hasta 1 cm de largo en los estados juveniles. Hojas simples, alternas o en espiral, hacia los extremos de las ramillas, de obovadas a elípticas o espatuladas, de 3-14 x 2-6 cm, con la base atenuada o cuneada y con 2 glándulas nectaríferas poco visibles, el margen entero y el ápice redondeado o emarginado. Son de consistencia subcoriácea, de color verde grisáceo, pubescentes de jóvenes y luego glabrescentes; nervadura con

4-8 pares de nervios laterales bien visibles. Pecíolo de 2-10(-15) mm de largo, seríceo o glabrescente. Inflorescencias en espigas axilares de 9-10(-18) cm de longitud con el raquis pubescente. Flores sésiles, de 3-4 mm de largo, olorosas, cremosas o blanco-verdosas, bisexuales o masculinas, con el receptáculo cupuliforme o acampanado, pubescente, de 1 x 2,5 mm, persistente en el fruto. Cáliz con 5 lóbulos triangulares muy cortos; corola ausente. Androceo con 10 estambres exsertos, con los filamentos blancos, de 4-5 mm de largo, y las anteras cremosas, de 0,4-0,5 mm. Disco nectarífero con 5 lóbulos, rodeando la base del estilo. Ovario con estilo glabrescente, de 5 mm de largo. Fruto en drupa ovoide o piriforme, ligeramente carnosa, de 5-8 x 2,5-4,5 mm, tomentulosa, con 5 lóbulos poco marcados, coronada por la parte superior del hipanto y el cáliz persistentes. Contiene una semilla negruzca.

**Cultivo y usos:** Requiere climas cálidos, suelos bien drenados y riegos periódicos, así como una exposición soleada, creciendo mal a la sombra. También tolera la contaminación urbana y la cercanía al mar, así como el viento y pequeñas heladas y sequías. Buena especie para árbol de sombra, que a menudo también se emplea en las técnicas bonsái. Se multiplica por semillas, siendo su crecimiento algo lento. Su madera es dura e incorruptible, utilizándose carpintería, en construcción naval y obras sumergidas. La corteza es rica en taninos y se emplea para curtir pieles.